

Váš lékař s vámi bude spolupracovat, aby správně stanovil dávku, která vám uleví od průlomové bolesti.

PRVNÍ PŘÍHODA PRŮLOMOVÉ BOLESTI



Před léčbou další příhody vyčkejte alespoň 4 hodiny.

DALŠÍ PŘÍHODA PRŮLOMOVÉ BOLESTI



Před léčbou další příhody vyčkejte alespoň 4 hodiny.

DALŠÍ PŘÍHODA PRŮLOMOVÉ BOLESTI



Před léčbou další příhody vyčkejte alespoň 4 hodiny.

Máte-li další otázky, obraťte se na svého lékaře.

*Kompletní informaci naleznete v SmPC.


**Potřebujete-li užít více 100 µg tablet, vložte jednu tabletu na každou stranu úst.

TITRAČNÍ SCHÉMA

100 MIKROGRAMŮ

Užijte **jednu tabletu přípravku Effentora®** o nejnižší dávce, což je **100 mikrogramů** (tableta je označena číslem 1)


Cítíte po 30 minutách odpovídající úlevu od bolesti?



200 MIKROGRAMŮ

Užijte **jednu tabletu přípravku Effentora®** **200 mikrogramů** (tableta je označena číslem 2)

Cítíte po 30 minutách odpovídající úlevu od bolesti?



400 MIKROGRAMŮ

Užijte **dvě tablety přípravku Effentora®** **200 mikrogramů** (tablety jsou označeny číslem 2)

Cítíte po 30 minutách odpovídající úlevu od bolesti?



Váš lékař s vámi bude spolupracovat, aby správně stanovil dávku, která vám uleví od průlomové bolesti.

DALŠÍ PŘÍHODA PRŮLOMOVÉ BOLESTI



Před léčbou další příhody vyčkejte alespoň 4 hodiny.

DALŠÍ PŘÍHODA PRŮLOMOVÉ BOLESTI



Máte-li další otázky, obraťte se na svého lékaře.

*Kompletní informaci naleznete v SmPC.

**Potřebujete-li užít více 100 µg tablet, vložte jednu tabletu na každou stranu úst.

600 MIKROGRAMŮ

Užijte **tři tablety přípravku Effentora®**
200 mikrogramů (tableta je označena číslem **2**)

Cítíte po 30 minutách odpovídající úlevu od bolesti?



ANO

Vaše správná dávka je **600 µg**



Označte křížkem dávku, kterou jste právě užili.

NE

Užijte další **200 µg** tabletu*



Při další příhodě průlomové bolesti užijte **4 tablety o síle 200 µg****



800 MIKROGRAMŮ

Užijte **čtyři tablety přípravku Effentora®**
200 mikrogramů (tableta je označena číslem **2**)

Cítíte po 30 minutách odpovídající úlevu od bolesti?



ANO

Vaše správná dávka je **800 µg**



Označte křížkem dávku, kterou jste právě užili.

NE

**OBRAŤTE SE NA SVÉHO
LÉKAŘE, KTERÝ VÁM
NAVRHNE JINÝ
ZPŮSOB LÉČBY**